

Calendário de Vacinação

Saiba quando e
quais vacinas seu
filho deverá tomar
desde os primeiros
dias de vida



Atenção, mãães! É hora de vacinar seu bebê. É muito importante que seu filho receba todas as vacinas do Calendário Básico, desde quando ele nasce. Assim ele estará protegido de várias doenças. Confira a tabela de vacinas:

IDADE	VACINAS	DOSES
Recém nascido	BCG - ID	Dose única
	Contra Hepatite B*	1ª dose
1 mês	Contra Hepatite B	2ª dose
2 meses	VORH (vacina oral de rotavírus humano)**	1ª dose
	VOP (vacina oral contra pólio)	1ª dose
	Tetraivalente (DTP + Hib)***	1ª dose
4 meses	VORH****	2ª dose
	VOP	2ª dose
	Tetraivalente	2ª dose
6 meses	VOP	3ª dose
	Tetraivalente	3ª dose
	Contra Hepatite B	3ª dose
9 meses	Contra febre amarela*****	Dose única
12 meses	SCR (tríplice viral)	Dose única
15 meses	VOP	Reforço
	DTP (tríplice bacteriana)	1º reforço
4 - 6 anos	DTP	2º reforço
	SCR	Reforço
10 anos	Contra febre amarela	Reforço

Fonte: Ministério da Saúde

* A 1ª dose da vacina contra hepatite B deve ser administrada nas primeiras 12 horas de vida do recém nascido.

** A 1ª dose da vacina oral de rotavírus humano pode ser administrado entre 1 mês e 15 dias e 3 meses e 7 dias de idade.

*** O esquema de vacinação é feito aos 2, 4 e 6 meses de idade com a vacina tetraivalente e dois reforços com a tríplice bacteriana (DTP). O 1º reforço aos 15 meses e o 2º entre 4 e 6 anos.

**** A 2ª dose da vacina oral de rotavírus humano pode ser administrados entre 3 meses e 7 dias e 5 meses e 15 dias de idade.

***** A vacina de febre amarela está indicado para crianças a partir de 9 meses de idade, que residem ou irão viajar para alguma área endêmica, área de transição e área de risco potencial. Vacinar 10 dias antes do dia da viagem.

BCG

Previne: formas graves de tuberculose

Reações: erupções no local

É melhor adiar a vacinação quando: o recém nascido está com menos de 2 kg

Contra hepatite B

Previne: hepatite B

Reações: febre e às vezes dores locais

É melhor adiar a vacinação quando: apresentar algum quadro infeccioso febril

VOHR - Vacina oral de rotavírus humano

Previne: diarreia por rotavírus

Reações: não foi comprovada nenhuma reação após o uso isolado ou juntamente com outra vacina

É melhor adiar a vacinação quando: apresentar quadro febril ($> 38,5^{\circ}$) ou diarreias e/ou vômitos que levem a hospitalização

VOP - Vacina oral contra pólio

Previne: poliomielite (paralisia infantil)

Reações: diarreias

É melhor adiar a vacinação quando: não há contra indicações, mas é melhor adiar em caso de febre alta, vômitos e/ou diarreia



Vacina tetravalente (DTP + Hib)

Previne: difteria, tétano e coqueluche. Meningite, pneumonias e otites.

Reações: febre e dores locais

É melhor adiar a vacinação quando: apresentar febre e convulsões

Vacina contra febre amarela

Previne: febre amarela

Reações: são efeitos raros de acontecer como febre, dores de cabeça e muscular

É melhor adiar a vacinação quando: se fez uso de vacinas com vírus vivo atenuado, como a SRC ou apresentar alguma alergia a ovo

VSRC (tríplice viral)

Previne: sarampo, rubéola e caxumba

Reações: coriza e febre

É melhor adiar quando: apresentar febre alta

Calendário de Vacinas em dia, seu filho estará protegido de doenças. Agora é hora de brincar muito, mas não esqueça de tomar todos os cuidados em casa para evitar acidentes.

